

ПАМЯТКА

По временному порядку организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь методом гемодиализа/гемофильтрации в условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

Введение. Настоящая памятка подготовлена **Ассоциацией нефрологов** с целью реализации положений Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» с учетом особенностей организации и проведения заместительной почечной терапии в условиях дневного стационара.

Ассоциация нефрологов подчеркивает, что настоящая **Памятка** носит общий характер, не содержит специфических протоколов и полностью соответствует основным положениям Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

Памятка составлена таким образом, чтобы предоставить врачам информацию и помочь в принятии решения в конкретной клинической и эпидемиологической ситуации.

Данную **Памятку** не следует рассматривать в качестве Указания, Приказа, Клинических рекомендаций и стандартов лечения. Различные варианты действий и отклонения в повседневной клинической практике неизбежны, поскольку клиницисты должны принимать во внимание особенности и нужды отдельного больного, доступные ресурсы и ограничения, имеющиеся в конкретном лечебном учреждении, а также нормативные документы Федеральных и Региональных органов власти.

1. Руководители медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь методом гемодиализа/геофилтрации в условиях дневного стационара, (далее - медицинские организации):

1.1. Должны принять меры по выявлению пациентов, получающих специализированную медицинскую помощь методом гемодиализа/геофилтрации в условиях дневного стационара (до допуска в диализный зал), с симптомами ОРВИ и/или внебольничной пневмонией, в том числе из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременных женщин), имевших контакт с людьми с подозрением на COVID-19 или находящимися на самоизоляции, а также выезжавшими за рубеж.

1.2. Обеспечить прием пациентов на гемодиализ (перед допуском в диализный зал) через приемно-смотровые боксы и/или фильтр-боксы, обеспечив медицинский персонал средствами индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные).

1.3. Предусмотреть разработку схемы дальнейшей маршрутизации пациентов с выявленными симптомами ОРВИ и/или внебольничной пневмонией в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, в соответствии с региональными схемами маршрутизации больных, нуждающихся в заместительной почечной терапии.

1.4. Принять меры по организации оперативной связи для медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь методом гемодиализа/геофилтрации в условиях дневного стационара, по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с подозрением, либо подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, с профильными специалистами медицинских организаций второго и третьего уровня, профильными главными внештатными специалистами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

1.5. Обеспечить наличие запаса расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, дезинфекционных средств и медицинских изделий, включая средства индивидуальной защиты

(шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные), пульсоксиметры.

1.6. Организовать информирование медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также сбора эпидемиологического анамнеза.

1.7. Обеспечить соблюдение температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции в медицинской организации, использование работниками медицинской организации средств индивидуальной защиты.

1.8. Принять меры по проведению обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

1.9. Предусмотреть увеличение кратности дезинфекционных обработок помещений медицинских организаций.

1.10. Обеспечить системную работу по информированию пациентов, получающих в медицинской организации заместительную почечную терапию, о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, обращая особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

1.11. Предусмотреть опрос лиц, получающих в данной медицинской организации заместительную почечную терапию, в том числе по телефону, на предмет наличия симптомов ОРВИ, контактов с гражданами, вернувшимися из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1.12. Обеспечить разделение работников медицинской организации на лиц, контактировавших с пациентами с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонией, и лиц неконтактировавших, исключив возможность их пересечения.

2. При выявлении пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, данными эпидемиологического анамнеза, необходимо действовать в соответствии с Приложением № 6 (**Алгоритм**

действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях) к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

3. Для недопущения внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь методом гемодиализа/гемофильтрации в условиях дневного стационара, медицинские работники должны выполнять следующий протокол мероприятий:

3.1. Медицинский работник, не выходя из помещения, в котором выявлен пациент, с использованием имеющихся средств связи извещает руководителя медицинской организации о выявленном пациенте и его состоянии для решения вопроса о его изоляции по месту выявления до госпитализации в специализированный инфекционный стационар.

3.2. Медицинский работник должен использовать средства индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified № 95, EU FFP2 или аналогичные), предварительно обработав руки и открытые части тела дезинфицирующими средствами.

3.3. Медицинские работники, выявившие пациента с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для новой коронавирусной инфекции COVID-19 симптомами, должны осуществлять наблюдение пациента до приезда и передачи его специализированной выездной бригаде скорой медицинской помощи.

3.4. После медицинской эвакуации пациента медицинский работник, выявивший пациента, снимает средства индивидуальной защиты, помещает их в бачок с дезинфицирующим раствором, обрабатывает дезинфицирующим раствором обувь и руки, полностью переодевается в запасной комплект одежды. Открытые части тела обрабатываются кожным антисептиком. Рот и горло прополаскивают 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывают 2% раствор борной кислоты.

3.5. Руководитель медицинской организации, в которой был выявлен пациент, обеспечивает сбор

биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) у всех медицинских работников и лиц, находившихся с ним в контакте, и направляет их для проведения соответствующего лабораторного исследования.

3.6. В целях обеззараживания воздуха в помещении проводится дезинфекция дезинфицирующими средствами, применяются бактерицидный облучатель или другое устройство для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения.

3.7. В случае подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо выявить лиц, имевших контакт с пациентом, с целью установления за ними медицинского наблюдения.

3.8. Диализный центр должен быть закрыт для приема на диализ новых больных.